

Култура	Болести	Доза мл/дка	Фаза на приложение
Пшеница	септориози ( <i>Septoria spp.</i> ) кафява ръжда ( <i>Puccinia recondita</i> ) жълта ръжда ( <i>Puccinia striiformis</i> ) черна ръжда ( <i>Puccinia graminis</i> ) брашнеста мана ( <i>Erysiphe graminis</i> ) листен пригор ( <i>Rhynchosporium secalis</i> )	90-100	от начало на удължаване на стъблото до край на цъфтежа (ВВСН 30-69)
Ечемик	брашнеста мана ( <i>Erysiphe graminis</i> ) септориози ( <i>Septoria spp.</i> ) кафява ръжда ( <i>Puccinia recondita</i> ) жълта ръжда ( <i>Puccinia striiformis</i> ) черна ръжда ( <i>Puccinia graminis</i> ) листен пригор ( <i>Rhynchosporium secalis</i> )	90-100	от начало на удължаване на стъблото до край на цъфтежа (ВВСН 30-69)
Захарно цвекло	церкоспороза ( <i>Cercospora beticola</i> ) рамулариоза ( <i>Ramularia beticola</i> ) брашнеста мана ( <i>Erysiphe betae</i> ) ръжда ( <i>Uromyces betae</i> )	80	от листата покриват 90% от повърхността- първият прицветник е видим (ВВСН 39-59)
Лозя	брашнеста мана ( <i>Uncinula necator</i> ) черно гниене ( <i>Guignardia bidwellii</i> )	24	от седмите листа са отворени до повечето от зърната се събират, грозда се затваря (ВВСН 17- 79)
Ябълки	брашнеста мана ( <i>Podosphaera leucotricha</i> )	19-24	от фаза „розов бутон“ до напреднало узряване (ВВСН 57- 83)
Ябълки и круши	струпяване ( <i>Venturia inaequalis; Venturia pirina</i> )	24	от фаза „розов бутон“ до напреднало узряване (ВВСН 57- 83)
Праскова, нектарина	брашнеста мана ( <i>Podosphaera pannosa</i> , <i>Podosphaera tridactyla</i> )	30	от начало на цъфтеж (отворени са около 10% от цветовете) до плодовете са достигнали половината от окончателната си големина (ВВСН 61- 75)
Пъпеш и дини (на полето)	брашнеста мана ( <i>Erysiphe cichoracearum</i> )	40	от първи разтворен цвят на главното стъбло до пълна зрялост (ВВСН 61- 89)
Краставици и тиквички, на полето и в оранжерии	брашнеста мана ( <i>Erysiphe cichoracearum</i> )	40	от първи разтворен цвят на главното стъбло до пълна зрялост (ВВСН 61- 89)
Артишок (на полето)	брашнеста мана ( <i>Leveillula taurica</i> )	20-30	листната розетка достига 10% от очаквания диаметър- формирана цялата листна маса (ВВСН 31- 49)
Рози (на полето, в оранжерии и на закрито)	брашнеста мана ( <i>Sphaerotheca pannosa/Podosphaera pannosa</i> )	20-40	през целия вегетационен период
Цветя	ръжди ( <i>Puccinia pelargonii-zonalis</i> , <i>Uromyces gladioli Puccinia horiana/ Uromyces dianthi</i> )	60-75	през целия вегетационен период
Домати (на полето)	листна плесен ( <i>Mycovellosiella fulva</i> ) брашнеста мана ( <i>Leveillula taurica</i> )	20-60	от първо съцветие: първи разцъфнал цвят до пълна зрялост (ВВСН 61- 89)