

РЕГИСТРАЦИЯ

Култура	Неприятел	Доза	Карантинен срок	Максимален брой приложения	Препоръки
Зърнено-житни култури, директно пръскане:	Житна гърица (<i>Sitophilus granarium</i>)				
	Оризова гърица (<i>S. Oryzae</i>)				
Пшеница,	Зърнов бръмбар (<i>Rhyzopertha dominica</i>)				Да не се допуска попадане на продукт върху транспортната лента
Ечемик,	Ръждивочервен брашнен бръмбар (<i>Tribolium castaneum</i>)				
Ръж,	Брашнен бръмбар (<i>T. confusum</i>)				
Овес,	Суринамски брашнояд (<i>Oryzaephilus surrinamensis</i>)	42 – 84 мл/тон зърно	Срок преди употреба: 1 ден	1	Да се следят максимално допустимите нива на остатъчни количества от пестициди
Тритикале,	Зърнояд (<i>Cyprotestes ferrugineus</i>)				
Лимец,	Зърнов молец (<i>Sitotroga cerealate</i>)				
Царевица,	Молец по сушените плодове (<i>Plodia interpunctella</i>)				
Ориз,	Брашнест акар (<i>Acarus siro</i>)				
Сорго,	Плесенен акар (<i>Tyrophagus putrescentidae</i>)				
Просо					
(съхранявани в складове)					