

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА: СИЛИТ 544 СК е одобрен в Р България за употреба при:

№	Култура	Болест	Приложение	Доза мл ПРЗ/ дка	Вода л/дка	Карантинен срок (дни)
1.	Ябълки Круши	Струпясване по ябълки (<i>Venturia inaequalis</i>) Струпясване по круши (<i>Venturia pyrina</i>)	Начало на набъбване на листни пъпки (ВВСН 01) до 60 дни преди прибиране на реколтата	125	20-150	60
2.	Череши Вишни	Листни петна по череша (бяла ръжда) (<i>Blumeriella jaapii</i> (синоним: <i>Coccomyces hiemalis</i>) Гномониоза (<i>Apiognomonia erythrostoma</i> (синоним: <i>Gnomonia erythrostoma</i>))	Първи отворени цветове (ВВСН 60) до 2 седмици преди прибиране (ВВСН 79 – плодовете са 90% от окончателната си големина) или след прибиране на реколтата	125	50-150	14
3.	Праскови Нектарини и произлизащите от тях хибриди	Къдравост (<i>Taphrina deformans</i>)	Начало на набъбване на пъпките (ВВСН 01) до край на цъфтеж (ВВСН 69) или (ВВСН 95-97) след опадане на 50% на листата до пълен листопад (есен)	165	50-150	75
4.	Маслини	Листни петна по маслината (<i>Cycloconium oleaginum</i>) Антракноза (<i>Glomerella cingulata</i>)	От развитие на първите листа (ВВСН 11) до край на цъфтеж (ВВСН 69) или през есента (преди и след прибиране на реколтата)	125-165	100	7