

РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБА НА ПРЕПАРАТА: Делтагри е одобрен в Р. България за

1. Домати и патладжан в доза 30 – 50 мл/дка :

Срещу прасковена листна въшка (*Myzus persicae*), памукова листна въшка (*Aphis gossypii*), листни въшки от род *Aphis* spp., картофена листна въшка (*Macrosiphum euphorbiae*), памукова нощенка (*Helicoverpa armigera*).

Количество работен разтвор - 60-100 л/дка.

Момент на приложение за листни въшки: при поява на неприятеля, край на формиране на страничните разклонения (ВВСН 40).

Момент на приложение за памукова нощенка: при поява на неприятеля - от фаза начало на цъфтеж до 30% от плодовете са с типичен цвят на зреене (ВВСН 50-83).

2. Марули в доза 25 – 50 мл/дка:

Срещу листни въшки по салатата (*Hyperomyzus lactucae*, *Nasonovia ribisnigri*), зелена прасковена листна въшка (*Myzus persicae*), нощенки от род *Helicoverpa* spp., египетска памукова нощенка (*Spodoptera littoralis*) и малка полска нощенка (*Spodoptera exigua*), в доза 25-50 мл/дка.

Количество работен разтвор - 50-100 л/дка.

Момент на приложение: при поява на неприятеля – от фаза разтворен пети същински лист до образувана е 80% от листната маса (ВВСН 15-48).

3. Артишок в доза 30 – 50 мл/дка :

Срещу молци по артишока (*Depressaria erinaceella* u *Gortyna xanthenes*), египетска памукова нощенка (*Spodoptera littoralis*) и малка полска нощенка (*Spodoptera exigua*), в доза 30-50 мл/дка.

Количество работен разтвор - 100 л/дка.

Момент на приложение: при поява на неприятеля – от фаза четвърти лист до загиване на листата (ВВСН 14-49).